

ID: 2013-11-5-T-3048

Тезис

Савина Е.А., Еремин А.О.

**Результаты клинического использования «опросника определения уровня стоматофобии»***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра протезтики стоматологических заболеваний*

В современной стоматологии все чаще стала встречаться особая группа пациентов со стоматофобией, что связано с наличием болевых ощущений во время стоматологического лечения. Актуально проводить дифференцированное определение уровня стоматофобии в первое посещение.

С этой целью нами был разработан «Опросник определения уровня стоматофобии» (удостоверение на рационализаторское предложение № 2839, «Способ оценки стоматофобии»). Опросник разделен на 2 части (А и В), каждая содержит по 6 вопросов. Блок А выявляет какого специалиста стоматологического профиля больше всего боится пациент, блок В определяет общий уровень стоматофобии и процедуру в процессе лечения, вызывающую наибольший страх у пациента. После разработки и первичной апробации опросника его применили на пародонтологическом приеме.

Опросник получил положительные отзывы врачей-пародонтологов. Он позволяет в первое же посещение за 1-2 минуты определить у пациента уровень стоматофобии, выявить наиболее «страшные», с точки зрения пациента, стоматологические манипуляции, что позволяет скорректировать свое поведение с пациентом, выработать индивидуальный деонтологический подход, а также назначить препараты из группы анксиолитиков для фармакологической коррекции выявленных изменений психологического статуса. Применение опросника в динамике посещений выявило редукцию (на 61%) индексной оценки уровня стоматофобии, что подтверждает правильность выработанного индивидуального деонтологического подхода.

Таким образом, «Опросник определения уровня стоматофобии» позволяет на амбулаторном стоматологическом приеме определить уровень стоматофобии у пациентов (при этом его заполнение занимает не более 2 минут), выработать индивидуальный деонтологический подход и осуществлять контроль за динамикой изменения уровня стоматофобии на протяжении всего курса лечения.

**Ключевые слова:** пародонтит, стоматофобия, опросник