ID: 2012-2-1276-T-1478 Тезис

Шарова Н.А.

Рак яичка: прошлое и настоящее

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра урологии

Рак яичка является достаточно редким заболеванием среди злокачественных новообразований мочеполовой системы у мужчин, однако смертность по данному заболеванию занимает первое место среди мужского населения трудоспособного возраста (20 – 40 лет), в связи с этим становится актуальным совершенствование методов ранней диагностики.

Цель исследования: провести сравнительный анализ выявления и диагностики рака яичка на базе 8-й и 3-й клинических больниц.

Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 56 историй болезней пациентов с раком яичка. Составлено две группы: в первой группе – 28 больных с вышеуказанным диагнозом, проходившее лечение с 1993 по 1999 года на базе 8-й клинической больницы; во второй группе – 28 пациентов, проходившие лечение с 2007 по 2011 года на базе 3-й клинической больницы. Средний возраст больных второй группы на 17,4% выше, чем первой группы, и составил 37 лет. При гистологическом исследовании были установлены следующие формы: семинома в первой группе у 16 (57,1%) больных, что на 31,25% больше по сравнению с показателями второй группы, где число пациентов – 11 (39,28%); несеминомные опухоли в первой группе у 12 (42,85%) больных, что на 29,41% меньше по сравнению с показателями второй группы, где число пациентов – 17 (60,71%). Стадии заболевания распределились следующим образом: в первой группе – стадия T_1 – у 1 (3,5%) больного, T_2 – у 7 (25%), T_3 – у 13 (46,4%) и T_4 –у 7 (25%) больных; во второй группе - стадия T_1 – у 8 больных раком яичка (28,57%), T_2 – у 8 (28,57%), T_3 – у 11 (38,28%), T_4 – у 1 (3,57%) больного. Таким образом, в первой группе в 71% случаев имелась T_{3-4} стадия заболевания, а во второй – в 42% случаев. Метастазы рака яичка в первой группе диагностированы у 18 (69,2%) пациентов: в лимфоузлы – у 16 (57,14%), в печень – у 4 (14,28%), в лёгкие – у 1 (3,57%). В свою очередь в первой группе всего лишь у 1 (3,57%) больного диагностированы метастазы рака яичка в лёгкие, печень, паракавальные, повздошные лимфатические узлы.

Выводы. Сравнительный анализ полученных данных показывает, что за последние десять лет ранняя диагностика рака яичка улучшилась, об этом свидетельствует увеличение больных с начальными стадиями заболевания и уменьшение пациентов с метастазами.

Ключевые слова: рак яичка.

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012.