

ID: 2013-02-27-T-2182

Тезис

Батырова Г.Н., Абрамкина С.С.

К эпидемиологии ВИЧ-инфекции в Саратовской области*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России*

Цель исследования. Установить основные закономерности развития эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции в Саратовской области в настоящее время на основании анализа официальных статистических данных.

На территории области продолжается рост заболеваемости данной инфекцией, хотя темпы ее роста значительно уменьшились. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения с клиническими проявлениями составила в 2011 г. 13,5 на 100 тыс. населения. В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных преобладают лица в возрасте 30-39 лет (39,0%), на втором месте возрастная группа 20-29 лет (34,7%), наблюдается также рост инфицированных лиц в более старших возрастных группах. Это свидетельствует о том, что ВИЧ-инфекция вышла за рамки групп риска и в настоящее время ею могут заражаться лица различного возраста.

Наиболее высокая пораженность населения ВИЧ-инфекции имела место в Балаковском и Вольском районах (эпицентр эпидемии в Саратовской области), Федоровском районе, г.Саратове и в Хвалынском районе.

Среди факторов риска заражения превалирует половой путь передачи, на который пришлось в 2011 г. 79,2%, на внутривенное введение наркотиков пришлось 19,2%, причем этот фактор заражения наиболее характерен для мужчин, находящихся в возрасте 18-30 лет, на вертикальный путь передачи пришлось 1,5%. Соотношение инфицированных мужчин и женщин составило 1:1,2, что следует поставить в продолжающуюся «феминизацию» эпидемии. Более 90% ВИЧ-инфицированных женщин находятся в активном, репродуктивном возрасте, что обуславливает рождаемость серопозитивных детей, число которых в последние годы имеет тенденцию к росту. Определенная часть этого контингента не имеет приверженности к проведению антиретровирусной профилактики ВИЧ-инфекции. При анализе социального состава инфицированных лиц, установлена высокая доля неработающего населения (55,0%). В 2011 г. было зарегистрировано 10 случаев ВИЧ-инфекции среди медицинских работников. При этом во всех случаях был установлен половой путь заражения, случаев профессионального заражения не было отмечено.

Из 602 ВИЧ-инфицированных лиц, которые были выявлены в 2011 г. у 310 человек (51,5%) выявлена сочетанная инфекция, из числа которых: ВИЧ-инфекция и туберкулез – 159 случаев (26,4%); ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С – 109 случаев (18,1%); ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем – 39 случаев (6,5). За весь период течения эпидемии в области всего было зарегистрировано 2632 случая смерти среди ВИЧ-инфицированных лиц (22,9%).

Таким образом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Саратовской области является достаточно напряженной, требующая активизации санитарно-просветительной работы по профилактике данного заболевания, а также по другим аспектам работы.

Ключевые слова
эпидемиология