

ID: 2014-05-3881-T-3462

Тезис

Сучкова О.М.

### **Буллезный пемфигоид Лёвера**

*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней*

*Научный руководитель: к.м.н., асс. Шерстнева В.Н.*

**Цель:** отразить современные аспекты этиологии, патогенеза и клиники буллезного пемфигоида как редко встречающегося пузырьного аутоиммунного дерматоза.

Термин «буллезный пемфигоид» был предложен Лёвером в 1953 году. Ранее он носил названия: доброкачественный хронический пемфигус, юношеский пемфигус, старческий пемфигус.

Пемфигоидом чаще страдают пожилые люди, однако он может встречаться у детей и подростков. В развитии заболевания определенная роль отводится повреждению кожи УФ излучением, лучевой терапии, механической травме и терапии некоторыми лекарственными препаратами. Имеются сообщения об ассоциации буллезного пемфигоида с другими аутоиммунными заболеваниями: системной красной волчанкой, красным плоским лишаем, псориазом, вульгарной пузырчаткой.

У больных буллезным пемфигоидом в крови и пузырьной жидкости обнаруживаются антитела класса IgG, реже IgA. Связывание антител с антигеном буллезного пемфигоида является начальным этапом в образовании пузыря. В зоне базальной мембраны происходит фиксация IgG в результате чего активизируется каскад комплементов, вызывающих хемотаксис нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, которые высвобождают протеолитические ферменты. При этом отмечается расслоение вдоль границы эпидермиса и дермы и образование субэпидермального пузыря. Через несколько дней он может стать интраэпидермальным по периферии за счет регенерации эпидермиса. Эпидермис, образующий покрывку, обычно плоский и может некротизироваться.

Существует несколько клинических форм буллезного пемфигоида: везикулезный, эритродермический, узловатый, себорейный, вегетирующий.

**Вывод.** Несмотря на то, что буллезный пемфигоид Лёвера является редким заболеванием, знание его клинико-морфологических особенностей необходимо для дифференциального диагноза с другими буллезными дерматозами.

**Ключевые слова:** буллезный пемфигоид Лёвера, доброкачественный хронический пемфигус, юношеский пемфигус, старческий пемфигус