Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2014. Volume 4. Issue 11

ID: 2014-11-1212-T-4369 Тезис

Горбунов А.А.

Нарушение центральных личностных функций у больных алкоголизмом

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Алкоголизм — заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него. Негативные последствия могут выражаться психическими и физическими расстройствами, нарушениями социальных отношений. Социальный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества.

Употребление алкоголя связано с такими социальными категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение и мода, с другой. Также потребление алкоголя связано с психологическими особенностями личности.

Отмечая актуальность данной проблемы, нами было проведено исследование центральных личностных функций у больных алкоголизмом и проведено сравнение с контрольной выборкой. Целью исследования является выявление различий центральных личностных функций у больных алкоголизмом и людьми, не страдающими алкогольной зависимостью.

Материал и методы. Для осуществления исследования проводился Я-структурный тест Г.Аммона, состоящий из 220 утверждений, которые группируются в 18 шкал, вопросы между шкалами не пересекаются. Шкалы, в свою очередь, группируются по шести основным Я-функциям, на диагностику которых они и направлены. Это Агрессия, Тревога/страх, Внешнее отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, Нарциссизм и Сексуальность. Каждая из этих функций, по Аммону, может быть конструктивной, деструктивной и дефицитарной - что и измеряется соответствующими шкалами. В исследовании приняли участие 10 испытуемых с диагностированным алкоголизмом II стадии и 10 испытуемых из контрольной группы. Испытуемые, больные алкоголизмом, имели возраст от 29 до 57 лет (средний возраст 39,3), участники контрольной группы были в возрасте от 26 до 53 лет (средний возраст составил 36,7).

Результаты. Больные алкоголизмом второй стадии в сравнении с контрольный группой, в целом, имеют повышения по деструктивным шкалам (Агрессия, Внешнее отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, Нарциссизм и Сексуальность), а так же повышение по дефицитарной шкале Тревога/страх.

Согласно проведенным исследованиям у больных алкоголизмом отмечается существенное искажение личностной структуры. Алкоголизация способствует перерастанию изначально измененных центральных личностных функций, таких как агрессия, тревога, внешнее отграничение Я, внутреннее отграничение Я, нарциссизм и сексуальность в деструктивные и дефицитарные формы, что проявляется в декомпенсации, нарушении социального приспособления. Эта категория больных нуждается в адекватной диагностике, которая позволит правильно выделить мишени проводимой терапии и выстроить трезвый прогноз течения заболевания.

Ключевые слова: влияние алкогольной зависимости на личность

 © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014