ID: 2015-02-1151-T-4557 Тезис

Акимова О.В., Белякова А.В., Аранович И.Ю.

Психоэмоциональное состояние больных с хронической ишемией головного мозга

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Хроническая ишемия мозга – особая разновидность сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функционирования.

Наличие депрессии, состояния астении, высокого уровня тревожности может привести к ухудшению течения заболевания и быстрого его прогрессирования. Следует так же отметить существующие сложности диагностики данного расстройства у больных хронической ишемией мозга, так как депрессия у них часто носит маскированный характер, а доминирующими в клинической картине оказываются соматовегетативные проявления и психовегетативный синдром.

Таким образом, **целью** данного исследования является диагностика тревоги и депрессии у пациентов с диагнозом хроническая ишемия головного мозга с помощью психодиагностического инструментария.

Объект исследования – пациенты неврологического отделения ГКБ №9 города Саратова с диагнозом хроническая ишемия головного мозга 2 степени в количестве 28 человек. Средний возраст респондентов – 67 лет. Из них 14 человек ранее перенесли инсульт.

Предмет исследования – тревога и депрессия у больных хронической ишемией головного мозга.

Методы психодиагностического исследования: опросник "Самочувствие, Активность, Настроение" (САН); субъективная шкала оценки астении (MFI-2O); шкала самооценки депрессии Цунга; шкала самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина.

Результаты. Собственное самочувствие 22 респондента (79%) оценивают благоприятно, 22 респондента (79%) оценивают собственную активность как нормальную. У всех опрошенных наблюдается высокие показатели астении, при этом больше внимания больные относят состоянию физической астении. У 68% испытуемых (19 человек) диагностируется состояние без депрессии, у 32% (9 человек) наблюдается состояние депрессии от легкой до умеренной степени тяжести. Показатели личностной тревожности: 16 (57%) респондентов имеют средний уровень, 10 (36%) – низкий уровень и 2 респондентов (7%) высокий. Показатели ситуативной тревожности: 13 (46%) – средние, 10 (36%) – низкие и 5 респондентов (18%) – высокие.

Выводы. В ходе исследования было установлено, что у больных с хронической ишемией головного мозга преимущественно наблюдается выраженное состояние астении. Испытуемых можно охарактеризовать как людей тревожных. Аффективные расстройства в виде депрессии для большинства из них не свойственны.

Ключевые слова: астения, тревога, ишемия головного мозга

 © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015