Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 5

76-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые ученые — здравоохранению»

Акушерство и гинекология

ID: 2015-05-257-T-4529 Тезис

Арутюнян А.К.

Ожирение как фактор риска акушерских и перинатальных осложнений

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

Научный руководитель: к.м.н. Суворова Г.С.

Растет частота распространенности ожирения среди беременных, которая составляет от 10 до 38% от общего числа беременных женщин. Актуальность проблемы ожирения в акушерстве обосновывается высокой частотой, как акушерских, так и перинатальных осложнений. Обобщенный анализ всех имеющихся систематических обзоров, посвященных проблеме ожирения при беременности, выявил большое количество противоречий. Результаты исследований проведенных в последние годы значимо отличаются от данных 20-летней давности. Вероятно, эти различия обусловлены изменением эпидемиологических показателей у пациенток, страдающих ожирением.

Цель исследования: изучить динамику клинико-эпидемиологических показателей беременных с ожирением за период 1991-2010 гг. Оценить значимость ожирения как фактора риска акушерских и перинатальных осложнений на основе многофакторного анализа.

Материал и методы. Проанализировано 2634 историй родов за период 1991-2010 г. Пациентки в зависимости от ИМТ были разделены на две группы: I – без ожирения (n=1395) и II – с ожирением (n=1239).

Результаты. При проведении многофакторного анализа выявлено, что ведущими факторами риска угрозы самопроизвольного выкидыша, гестационной гипертензии, хронической внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентарной недостаточности при ожирении является наличие соматической и гинекологической патологии в анамнезе (OR = 3,5; 4,7; 6,2; 6,8). Показатели частоты гестационных и перинатальных осложнений у пациенток с ожирением за период 2005-2010 гг, достоверно ниже по сравнению с периодом 1991-1995 гг. За исследуемый период у пациенток с ожирением отмечается изменение эпидемиологических показателей: средний возраст снизился на 5,4 лет, частота соматической патологии уменьшилась на 22,4%, гинекологической патологии – на 26,3%.

Выводы. Снижение, за последние годы, частоты гестационных и перинатальных осложнений у пациенток с ожирением может быть связано с изменением эпидемиологических показателей: снижения возраста, частоты соматических и гинекологических заболеваний.

Ключевые слова: гинеколог

 © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015