ID: 2015-05-6-T-4673 Тезис

Богомолова Ю.С., Рябова Т.Ю., Кадыков А.Л., Попова О.В., Музурова Л.В.

Индивидуальная изменчивость тела и ветви нижней челюсти

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Высота тела нижней челюсти находится в диапазоне от 25,7 до 29,8 мм и в среднем составляет 28,0 мм. С учетом сигмальных отклонений по величине изученного параметра все нижние челюсти были разделены на 3 группы: со средней высотой тела, с низким телом и высоким телом. В большинстве наблюдений встречались нижние челюсти, имеющие среднюю высоту тела (75,0%). В данном случае параметр варьировал в диапазоне от 20,0 до 32,0 мм. Нижние челюсти, имеющие высокое тело (32,0 мм и более) выявлялись в 21,7% наблюдений. Нижние челюсти, имеющие низкое тело определялись в единичных наблюдениях (3,3%).

Высота ветви нижней челюсти находится в диапазоне от 46,0 до 74,0 мм и в среднем составляет 61,6 мм. параметр не имеет билатеральных различий (P>0,05). С учетом сигмальных отклонений по величине изученного параметра все нижние челюсти были разделены на три группы: со средней длиной ветви, с короткой ветвью и с длинной ветвью. В большинстве наблюдений определялись нижние челюсти, имеющие среднюю длину ветви (92,0%). В данном случае параметр находился в диапазоне от 47,6 мм до 75,6 мм. Нижние челюсти, имеющие короткие ветви (менее 47,6 мм) определялись в 8,0% наблюдений. В изученной группе не выявлены нижние челюсти, имеющие длинные ветви (75,6 мм и более).

Исследование показало, что высота тела нижней челюсти соотносится с высотой ветви как 1:2,2.

Ключевые слова: нижняя челюсть, изменчивость