

ID: 2015-12-1212-T-5788

Тезис

Вязовченко В.А., Козлов А.Е., Сизов С.В., Абросимова Ю.С.

Суицидальная активность пациентов с параноидной шизофренией*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии*

Актуальность изучения суицидальной активности у пациентов обусловлена высоким уровнем самоубийств. Около половины больных за период заболевания шизофренией совершают суицидальные попытки, причем 10% из них приводят к летальному исходу.[1] В одном из последних исследований суицидального поведения психически больных показано, что пациенты, страдающие шизофренией, составили более половины случаев – 58,2% [1].

Цель исследования: изучение уровня суицидальной активности у пациентов параноидной шизофренией с использованием психометрических методик.

Материал и методы. Было проведено исследование 20 пациентов с параноидной формой шизофрении, проходивших лечение в психиатрическом отделении ГУЗ "Саратовская ГКБ № 2 им. В.И. Разумовского". Для оценки суицидального риска были использованы опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и опросник Б. Любан-Плоцца с соавторами.

Результаты. Исследование по опроснику Б. Любан-Плоцца показало, что из 20 пациентов – у 13 (65%) был выявлен низкий тестовый показатель суицидальной активности, у 5 пациентов (25%) пониженный показатель суицидального риска и у 2 (10%) средний.

По опроснику суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой было выявлено, что среднее арифметическое значение показателя демонстративности составило 28%, аффективности 37%, уникальности 26%, несостоятельности 38%, социального пессимизма 42%, слома культурных барьеров 35%, максимализма 48%, временной перспективы 32% и антисуицидального фактора 55%.

Выводы. Таким образом, в результате исследования по опроснику Б. Любан-Плоцца у большинства пациентов был выявлен низкий уровень суицидальной активности, а по опроснику суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой был выявлен выраженный антисуицидальный фактор, выраженный инфантильный максимализм ценностных установок, а также обнаружена тенденция к социальному пессимизму. Следовательно, своевременное обнаружение признаков повышенного суицидального риска закономерно способствует превенции аутоагрессивного поведения больных шизофренией. [2]

Литература

1. Распопова Н.И. Механизмы формирования, клинические особенности и профилактика суицидального поведения у больных с психическими расстройствами. Дисс. докт. мед. наук. М., 2010. 460 с.
2. Сырчина Т.Д., Старчиков Д.А., Жданок Д.Н. Выявление суицидального риска у больных шизофренией на ранних этапах заболевания. 2014.

Ключевые слова: параноидная шизофрения, суицидальная активность