ID: 2016-05-1149-T-6868 Тезис

Амхадов Э.О., Гумалатов Н.Р., Муртазаев М.Р., Шибалин А.В.

Анализ факторов риска у больных глаукомой

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней

Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г.

Введение. Существуют локальные и системные факторы, способствующих развитию и прогрессированию первичной открытоугольной глаукомы. К системным факторам относят наследственность, возраст, органические или функциональные нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга, изменение реологии крови, пониженное перфузионное давление, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Цель: анализ системных факторов риска у больных первичной открытоугольной глаукомой.

Материал и методы. В исследовании участвовало 25 пациентов в возрасте от 55 до 74 лет с глаукомой различной стадии. Проводился опрос пациентов и анализ медицинской документации. Выявлялись следующие факторы риска: наследственность (со слов пациента), возраст начала заболевания (по данным амбулаторных карт или со слов пациента), органические или функциональные нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга (по данным осмотра терапевта), изменение вязкости и нарушение свертываемости крови (результаты анализа крови), артериальная гипертензия (по данным осмотра терапевта), сахарный диабет (анализ крови на глюкозу и по данным осмотра терапевта).

Результаты. Фактор риска наследственности встречался у 10 пациентов (40% обследуемых). Возраст начала заболевания у 6 пациентов (24%) составил 60 лет и менее, у 19 больных (76%) заболевание было диагностировано в возрасте старше 60 лет. Нарушение кровоснабжения в сосудах головного мозга было зафиксированы у 18 больных (72% пациентов), при этом артериальная гипертония наблюдалась у 16 больных (в 64% случаев). Изменение реологии крови зафиксировано у 4 больных (16%), а сахарный диабет был выявлен у 6 пациентов (24 % больных).

Выводы. В результате проведенного исследования наиболее часто выявляемыми факторами риска развития и прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы являлись: возраст старше 60 лет, нарушение кровоснабжения в сосудах головного мозга и артериальная гипертония.

Ключевые слова: факторы риска у больных глаукомой

 © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016