

ID: 2016-05-1656-T-6440

Тезис

Жемионис Ю.А., Сидорина И.Н., Цека Ю.С., Чудакова Т.К.

Этиологические и эпидемиологические особенности гриппа в период 2009 – 2013гг.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Изучение проявлений гриппа в зависимости от серотипов возбудителей составляет актуальную проблему.

Цель работы: выявление эпидемиологических особенностей в 2009-2013 гг в зависимости от превалирующих серотипов вирусов гриппа в разные годы изучаемого периода.

Материалом исследования являлись официальные данные госсанэпиднадзора по Саратовской области и данные разработки 100 историй болезни детей, пролеченных в 5 ДИКБ г. Саратова.

Первые случаи больных гриппом детей зарегистрированы в июле 2009 года. В этом году отмечался пик заболеваемости гриппом вызванным вирусом гриппа А (H1N1)pdm09, являющимся возбудителем пандемии в 2009 году. Этот серотип, называемый вирусом свиного гриппа, был превалирующим в этом году и составлял 97% от всех заболевших. В тяжелых случаях заболевание сопровождалось развитием нейротоксикоза в первые дни болезни, а также осложнениями в виде обструктивного бронхита или бронхопневмоний. В постпандемический период произошла смена штаммов вируса гриппа с одновременной циркуляцией вирусов H3N2 и гриппа В, при снижении заболеваемости вирусом свиного гриппа.

А (H1N1)pdm09. Количество тяжелых форм при этом имело четкую тенденцию к снижению и в определенной степени к уменьшению случаев нейротоксикоза и осложнений. Анализ ежегодной заболеваемости гриппом в зависимости от серотипов возбудителя выявил волнообразность заражения с чередованием подъема заболеваемости отдельными серотипами вирусов гриппа.

Ключевые слова: грипп А (H1N1)pdm09, грипп, эпидемиология