

Педиатрия

ID: 2016-06-376-T-6145

Тезис

Никитина Т.В., Матасова Ю.А., Козловская М.Л.

Психосоматический характер бронхиальной астмы

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии

Научный руководитель: асс. Сухова Т.Г.

Актуальность. Бронхиальная астма остается самым частым хроническим заболеванием нижних дыхательных путей у детей во всем мире. Поэтому становится актуальным исследование психологической характеристики больных данной патологией.

Цель работы: анализ психологических особенностей больных бронхиальной астмой.

Материал и методы. Было проведено тестирование 17 больных бронхиальной астмой, наблюдавшихся в КГП КБ им. С.Р. Миротворцева с сентября 2015г по январь 2016г, в возрасте от 9 до 15 лет. Анализировались состояние памяти испытуемых, активность и устойчивость внимания, динамика работоспособности, эмоциональные особенности, тревожность, страхи, депрессия, сфера общения и социальных отношений. Использованы методики Лурия и Шульте, рисуночный тест.

Результаты. По результатам методики Лурия была составлена кривая запоминания. В большинстве случаев (42%) кривая носила зигзагообразный характер, что свидетельствует о неустойчивости, колебаниях внимания. В 34% случаев отмечалось ослабление активного внимания и выраженная утомляемость испытуемых. У 24% испытуемых кривая носила восходящий характер, свидетельствующий о том, что функция запоминания не нарушена. При отсроченном воспроизведении слов нарушение памяти отмечалось у 17% пациентов.

При анализе методики Шульте 65% испытуемых показали хорошую работоспособность, высокий уровень вработываемости. В 35% случаев больным требовалось больше времени, чтобы влиться в процесс.

При анализе рисуночного теста у большинства пациентов (69%) отмечался повышенный уровень тревожности, в ряде случаев с формированием навязчивых страхов. У 41% исследуемых отмечалась склонность к депрессивным состояниям. Выявлено, что подавляющее большинство пациентов являлись экстравертами (70%), что проявлялось в повышении общительности и потребности во внимании к себе, у половины этих пациентов отмечались признаки демонстративности поведения. Интроверты встречались значительно реже (11%). Мало свойственен такой признак как агрессивность в поведении, которое отмечалось у 3 пациентов, и негативизм – у 1 ребенка. Признаки астенизации отмечались только у 17%. У трети исследуемых больных отмечалась эмоциональная лабильность и напряженность.

Выводы. Бронхиальная астма является заболеванием, оказывающим влияние на психоэмоциональное состояние пациентов в виде повышения уровня тревожности и склонности к депрессивным состояниям, а также формирования экстравертности характера пациентов. Признаки астеновегетативного синдрома, а также нарушение памяти отмечались значительно реже.

Ключевые слова: бронхиальная астма, психосоматика