ID: 2016-11-5-T-6955 Тезис

Абрамова В.И., Матыцина И.В.

Лингвализированная окклюзия

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической

Научный руководитель: к.м.н. Матыцина Т.В.

Актуальность: равномерное распределение жевательной нагрузки вдоль всей зубной дуги является идеальным вариантом окклюзионной схемы при изготовлении покрывного протеза с опорой на дентальные имплантаты.

Цель работы: достижение слабых билатеральных контактов передних и боковых зубов во время экскурсионных движений со смещением нижней челюсти на 2-3 мм из положения ЦО при наличии слабо выраженной компенсационной кривой.

Материал и методы. Решение проблемы стабильности полного съемного протеза заключалось в правильном позиционировании зубов в щечно-язычном направлении. Был создан единственный контакт между небными бугорками боковых зубов верхней челюсти и боковыми зубами нижней челюсти, что способствовало уменьшению действия боковых жевательных сил.

Результаты. В ходе проведенного нами исследования на естественных зубных рядах многочисленных пациентов, было выявлено, что язычные бугорки боковых зубов нижней челюсти проходят между двух воображаемых линий, которые начинаются у медиальной проксимальной поверхности клыка нижней челюсти и идут в передне-заднем направлении до ретромолярного треугольника. Функциональные позиции боковых зубов нижней челюсти определяют позиции боковых зубов верхней челюсти.

Выводы: постановка искусственных зубов съемного протеза с опорой на дентальные имплантаты должна быть выполнена таким образом, чтобы небные бугорки боковых зубов верхней челюсти находились в контакте с фиссурами антагонистов нижней челюсти как в ЦО, так и при выполнении нижней челюстью эксцентрических движений.

Ключевые слова: лингвализированная окклюзия, дентальные имплантаты, стабильность протеза

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016