

ID: 2017-06-257-T-14588

Тезис

Паутова А.В., Смирнова С.Е.

**Клиническое наблюдение беременной женщины с неходжкинской лимфомой в анамнезе***ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета**Научный руководитель: к.м.н. Наумова Ю.В.*

**Введение.** Лимфома - злокачественная опухоль, поражающая лимфатическую систему организма. Преимущественно страдают лица репродуктивного возраста, в связи с этим возникают вопросы по поводу течения, тактики ведения беременности и способа родоразрешения у женщин с данной патологией.

**Цель исследования:** изучить влияние тактики лечения женщины до наступления беременности.

**Материал и методы.** Проведено исследование истории родов женщины с неходжкинской лимфомой. Использованы: выкопировка данных из индивидуальной карты беременной, история родов; клинико- лабораторное обследование беременной и новорожденного.

**Результаты.** Пациентка М.Н.Е. с диагнозом: роды 1, срок гестации 36 нед. Роды путем кесарева сечения.

Сопутствующее заболевание: неходжкинская лимфома, медиастенальная в-клеточная, крупноклеточная, 4А степень (объемное образование средостения, поражение правой теменной кости) в 2012г.

Дата взятия на учет 24.02.2016 (на сроке 6 недель).

Анамнез. Диагноз неходжкинская лимфома поставлен в 2012году. В 2013 году проведено 5 циклов полихимиотерапии . Эффект частичный. В результате обследования у пациентки были выявлены признаки портальной гипертензии и вероятно угроза кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода. От прерывания беременности пациентка отказалась. Неоднократно находилась в стационаре по поводу ОРЗ.

9.09.2016 родоразрешена оперативно при сроке беременности 36 недель.

Родился недоношенный мальчик с весом 2580,рост 47 см , с оценкой по шкале Апгар 6-7 баллов. Состояние ребенка после рождения тяжелое, обусловленное дыхательными расстройствами (внутриутробная пневмония), неврологической симптоматикой на фоне морфофункциональной незрелости. Церебральная ишемия 1 степени.

**Выводы.** Имеет значение физиологическая иммунодепрессия в составе с частичным эффектом от специфического лечения, а также отсутствие длительной ремиссии заболевания, что привело к проблемам течения беременности (частые ОРЗ) и послужило причиной инфицирования плода.

**Ключевые слова:** неходжкинская лимфома