

ID: 2017-06-257-T-14594

Тезис

Слюсарева Е.Д.

### Проблема невынашивания беременности в I триместре

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС

Научный руководитель: к.м.н. Яковлева О.В.

Проблема невынашивания беременности является одной из центральных в современном практическом акушерстве и гинекологии, поскольку, отрицательно влияя на уровень рождаемости, перинатальной заболеваемости и смертности, имеет не только медицинское, но и социально-экономическое значение.

Невынашивание беременности, как правило, является следствием нескольких причин, оказывающих свое действие одновременно или последовательно.

**Цель работы:** изучение факторов риска и эффективности терапии угрожающего аборта в I триместре беременности.

**Материал и методы.** При исследовании данной проблемы использовались материалы из научной литературы. Обследовались беременные женщины с наличием экстрагенитальной и генитальной патологии, отмечалась особенность протекания беременности, увеличение частоты выкидышей

**Результаты.** В результате исследования выявлено, что от 40 до 60% выкидышей, которые происходят на ранних сроках беременности, обусловлены хромосомными аномалиями зародыша. Второе место принадлежит эндокринным нарушениям, которые выявляются в 17-23% случаев у женщин с невынашиванием беременности. Следующей причиной является острая инфекция (8-20%). Невынашивание беременности вследствие воспалительного процесса обусловлено проникновением возбудителей инфекции из материнского организма через плаценту к плоду.

**Выводы.** Считается, что своевременное выявление, постановка на учёт и обследование женщин групп риска по невынашиванию беременности, систематический контроль над возможным возникновением инфекционных осложнений и адекватная терапия снижает вероятность повторного выкидыша.

**Ключевые слова:** беременность, риск, невынашивание, причины