

ID: 2017-07-23-T-16290

Тезис

Исакулов Ш.Р.

### **Использование глиатилина при лечении больных с ишемическим инсультом**

*Самаркандская областная больница ортопедии и травматологии, г. Самарканд, Узбекистан*

По данным Всемирной организации здравоохранения инсульт является одной из ведущих причин смертности населения.

**Цель исследования:** изучить эффективности глиатилина при лечении больных с ишемическим инсультом.

**Материал и методы.** Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезни больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу, получивших лечение в отделении нейрохирургии Самаркандской областной больницы ортопедии и травматологии в периоде с 2015 по 2016 гг. Больные были разделены на 2 группы. Основная группа составляет 23 больных, получивших глиатилин. Контрольная группа 23 больных плацебо контроль. Все больные госпитализированы после 10 суток в отделении. Возраст больных колебался от 52 до 67 лет. Отмечено значительное преобладание мужчин по сравнению с женщинами.

**Результаты и обсуждение.** В неврологическом статусе в начале лечения отмечены общее мозговая симптоматика 14 больных, парезы различной степени у 14 больных с выраженностью двигательного дефекта от 0 до 4 баллов, по 5 бальной шкале; различные формы афазий у 16 пациентов; когнитивные расстройства отмечены практически у всех больных основной группы.

В контрольной группе больных отмечались аналогичные по частоте и выраженности неврологические и психопатологические синдромы.

Лечение глиатилина начинали в 1-е сутки с момента поступления, в дозе по 400 мг 1 раза в день внутривенно.

В 23 (100%) наблюдениях основной группы отмечено более быстрое улучшение состояния на фоне применения препарата, по сравнению с контрольной группой, в виде уменьшения в первую очередь общее мозговой и очаговой неврологической симптоматики к концу курса лечение.

**Выводы.** Применение глиатилина больных с ишемическим инсультом дает больных более быстрое улучшение состояния.

**Ключевые слова:** инсульт, глиатилин