

ID: 2017-09-5-T-14566

Тезис

Сальников Н.В.

**Повышенная стираемость зубов, как фактор развития снижающегося прикуса. Этапы лечения***ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической**Научный руководитель: к.м.н. Сальников В.Н.*

**Актуальность.** При воздействии соприкасающихся поверхностей зубных рядов во время жевания происходит систематическое стирание их твёрдых тканей - это один из видимых признаков старения организма. Повышение эстетических требований пациентов и актуальность проблемы заставляет искать новые решения данной задачи.

**Цель и задачи:** оценить эффективность и целесообразность двухэтапного лечения пациентов с осложненными формами повышенной стираемости методом постепенной дезокклюзии.

**Материал и методы.** Нами проведено лечение пациента 44 лет с декомпенсированной локализованной во фронтальном отделе смешанной формы повышенной стираемостью твердых тканей зубов второй степени тяжести. Восстановление межальвеолярной высоты осуществлялось с помощью временной съемной каппы-протеза, которая явилась одновременно имедиат-протезом. 2-й этап лечения заключался в протезировании зубов и устранении дефектов зубных рядов с помощью культевых-штифтовых вкладок и керамических коронок.

**Результаты.** Пациент был эстетически удовлетворен. В результате проведенного лечения было достигнуто восстановление межальвеолярной высоты и высоты нижней трети лица, анатомической формы и величины зубов, нормализация положения нижней челюсти, окклюзионных взаимоотношений зубных рядов.

**Вывод.** Преимущество двухэтапного лечения пациентов, страдающих повышенной стираемостью, состоит в нормализации нагрузки на ВНЧС, перестройке миотатического рефлекса и адаптацией пациентов к восстановленной физиологической высоте прикуса.

**Ключевые слова:** ортопедия, стираемость, восстановление высоты