

Терапия, фтизиатрия

ID: 2018-04-1749-T-16829

Тезис

Тлепсерукова С.А.

Особенности социального статуса и клинических проявлений туберкулеза у женщин с хроническими заболеваниями печени

*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ИДПО**Научный руководитель: д.м.н. Салина Т.Ю.*

Актуальность. Заболевания печени являются неблагоприятным фактором, способствующим утяжелению течения туберкулеза (ТВ) и снижению эффективности его лечения. Отмечается повсеместный рост сочетания ТВ и хронических заболеваний печени.

Цель: определить частоту хронических заболеваний печени, социальные характеристики и клинические проявления ТВ у женщин, проживающих в Саратовской области.

Материал и методы. Проанализирована медицинская документация (истории болезни и карты выбывших из стационара) 195 женщин в возрасте от 20 до 65 лет, находившихся на лечении ОКПТД в 2017 г.

Результаты. Установлено, что заболевания печени регистрируются у 37 (18%) женщин с впервые выявленным ТВ легких. Из них: вирусный гепатит С - у 15 (78,5%), вирусный гепатит В - у 2 (5,4%), токсическое поражение печени - у 20 (54%). У 17 (45,9%) пациенток выявлено сочетание ТВ, гепатита и ВИЧ-инфекции. Клинические формы ТВ представлены: инфильтративным ТВ - у 25 (67,5%), диссеминированным - у 6 (16,2%), фиброзно-кавернозным - у 2 (5,4%), очаговым ТВ - у 4 (10,8%) человек. Из них с бактериовыделением было 13 (35,1%), с распадом легочной ткани - 12 (32,4%). У 13 (35,1%) пациенток выявлена множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) возбудителя.

Наибольший процент заболеваний печени выявлен у женщин в возрасте от 30 до 40 лет - 17 (45,9%), реже встречалось поражение печени в возрасте старше 40 лет - 12 (32,4%) и моложе 30 лет - 8 (21,6%) пациенток. Социальный статус обследованных: безработные - 30 (81%) работающие - 7 (19%), и 2 (5,4%) пациентки имели статус «без определенного места жительства».

Выводы. ТВ в сочетании с хроническими гепатитами у женщин чаще встречается в среднем возрасте от 30 до 40 лет - 45,9%, преимущественно безработных - 81% и характеризуется преобладанием более тяжелых форм ТВ, часто в сочетании с ВИЧ - 67,5% и высоким уровнем МЛУ - 35,1%. Данная группа пациентов представляет собой группу высокого риска по неблагоприятному течению ТВ и нуждается в постоянном медицинском наблюдении и эпидемиологическом надзоре.

Ключевые слова: туберкулез, гепатит, ВИЧ