

Оськина Н.Б., Шоломова Е.И., Костин О.Н., Шоломов И.И.

Впервые выявленный ВИЧ-инфицированный контингент пациентов

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальная характеристика**Актуальность**

В начале этого столетия к повышенному риску заражения ВИЧ - инфекцией относились весьма определенные группы населения. Это были, как правило молодые асоциальные люди, не работающие, употребляющие инъекционные наркотические средства, лица находящиеся в местах лишения свободы или других условиях изолированного пребывания. К этому же контингенту относились секс-работницы и их клиенты, трансгендерные лица, гомосексуалы. ВИЧ - инфицированные независимо от места проживания или местных условий сталкивались в процессе жизни с правовыми и социальными проблемами в связи с их поведенческими характеристиками и делала их более уязвимыми к ВИЧ, что затрудняло доступ к программам их тестирования и лечения.

Однако, за последнее время эта группа населения видоизменилась, как в социальном, так и в возрастном аспектах.

Цель: проследить социальную характеристику пациентов, у которых впервые диагностировалась ВИЧ инфекция при стационарном обследовании. При этом обследуемый контингент никогда не был в пеницитарном учреждении.

Результаты и обсуждение

Обследование пациентов на ВИЧ инфекцию в стационарах города, согласно действующим приказам МЗ РФ, осуществляется либо в рамках существующих стандартов медицинского обследования и лечения, либо только с согласия пациента. На стационарный этап лечения в три отделения ГУЗ «СГКБ № 9» неврологическое, терапевтическое и челюстно-лицевой хирургии поступает вполне благополучная в социальном отношении группа лиц, которая и обследуется на ВИЧ инфекцию по клиническим показаниям и в рамках стандартов. При этом следует учитывать, что лица с уже имеющимся диагнозом «ВИЧ-инфекция» - повторно не обследуются. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Из 161 ВИЧ-инфицированного пациента 109 или 67,7% составили мужчины, женщины соответственно — 32,3%. Людей работающих и пенсионеров стало больше — в сумме 114 человек или 70,8%. Не работающих стало только 29,2%. Изменился контингент больных и по возрастному составу, старше 40 лет.

Складывается впечатление, что в эпидемический процесс в настоящее время вовлекаются и «благополучная», трудоспособная категория граждан, гетеросексуальная, не употребляющая наркотики и не находящаяся ранее в пеницитарном учреждении. Своевременное выявление ВИЧ - инфицированных в данной категории граждан и внедрение эффективных профилактических мероприятий способно повлиять на процесс распространения ВИЧ -инфекции среди широких слоев населения.

Таблица 1. Контингент ВИЧ-инфицированных пациентов

Профиль отделения	Год	Количество ВИЧ-инфицированных	пол		Возраст	Социальная группа		
			м	ж		Неработающие	Работающие	Пенсионеры
Неврология	2015	18	12	6	21-45	5	13	0
	2016	25	18	7	32-51	7	18	0
	2017	30	21	9	31-54	4	25	1
Терапия	2015	1	1	0	42	1	0	0
	2016	0	0	0	0	0	0	0
	2017	1	0	1	34	0	1	0
Челюстно – лицевая хирургия	2015	24	14	10	39-56	9	13	2
	2016	26	19	7	28-54	8	17	1
	2017	36	24	12	23-62	13	20	3
ИТОГО		161	109	52		47	107	7