

ID: 2018-07-5-T-18253

Тезис

Гянджалиев Я.А., Ризаханова А.М.

Целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний

Научные руководители: к.м.н. Савина Е.А., асс. Асланян М.А.

На сегодняшний день поставлена под вопрос целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса. Как известно, кальций содержащие препараты, используемые в качестве лечебных прокладок, стимулируют процесс образования заместительного дентина и нормализуют кровоснабжение пульпы.

Однако, не смотря на ряд положительных свойств, имеются и недостатки: отсутствие адгезии к дентину, приводящее к нарушению сцепления постоянной пломбы с тканями зуба и дальнейшему возникновению рецидивирующего кариеса.

Цель исследования: обосновать целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса.

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20 пациентов с диагнозом КО 2.1. 10 пациентов были пролечены с использованием в качестве лечебной прокладки материала, содержащего гидроксид кальция. 10 пациентов были пролечены без использования лечебных прокладок. После пломбирования был проведен рентгенологический контроль.

Результаты. Через 6 месяцев на контрольных рентгенограммах наблюдалось образование заместительного дентина как в первой, так и во второй группах.

Вывод. Так как скорость образования заместительного дентина минимально зависит от кальций содержащих препаратов, применение лечебных прокладок можно назвать нецелесообразным.

Ключевые слова: кариес, лечение, лечебные прокладки