

ID: 2018-10-1656-T-18444

Тезис

Кашкина Т.И., Башарова Ю.С., Леонова А.А.

Энтеровирусная инфекция в Саратовской области (2015-2017 гг.)*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России**Научный руководитель: к.м.н. Каральский С.А.*

Актуальность. В последние годы отмечается значительный рост случаев инфекционных заболеваний, вызванных энтеровирусами. Общая заболеваемость в России составляет 4.74 случаев заболевания на 100 тыс населения, среди которых 95% составляют дети. Однако это не истинные цифры заболеваемости, поскольку на долю бессимптомного носительства приходится до 85%. 12-14%- легкие лихорадочные заболевания. Примерно 1-3%- тяжелое течение, особенно у детей раннего возраста. Энтеровирусная инфекция создает постоянную угрозу возникновения как спорадических форм, так и массовых вспышек заболевания.

Цель: анализ динамики роста энтеровирусной инфекции с 1.01.2015 по 31.12.2017, выявление эпидемиологических и клинических особенностей энтеровирусной инфекции за последние 3 года.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни детей с энтеровирусной инфекцией с 1.01.2015 по 31.12.2017 на базе ОДИКБ им. Н.Р. Иванова. Статистический анализ Excel 2010.

Результаты. За последние 3 года наблюдается рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330 случаев заболевания в год.

Отмечается отрицательная динамика, выражающаяся в увеличении количества случаев данных клинических форм за последние 3 года: энтеровирусного менингоэнцефалита- рост с 25 до 214 случаев , везикулярного фарингита энтеровирусной этиологии –с 8 до 92 случаев, везикулярного фарингита и острого гастроэнтерита- с 0 до 7 случаев в год.

Отмечается положительная динамика в отношении везикулярного стоматита и экзантемы: уменьшение количества случаев с 2 до 0 и везикулярного фарингита и экзантемы: с 19 до 12 случаев за последние 3 года.

С 2016г. возросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией, вызванная ЕСНО.

Выводы:

1. В течении трех лет (период с 1.01.2015 по 31.12.2017) произошел рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330 случаев в год.
2. С 2016 года наиболее частыми возбудителями энтеровирусной инфекции являются ЕСНО.
3. Преобладающими клиническими вариантами в 2017 году является менингоэнцефалит (214 больных – что составляет 65% от общего числа) и везикулярный фарингит (92 случая заболевания - что составляет 28% от общего числа).

Ключевые слова: энтеровирусы, менингоэнцефалит, ЕСНО