

ID: 2019-07-5-T-18941

Тезис

Рокитянская А.И., Ратушная А.В., Павлова А.О.

Осложнения, возникающие в ходе операции синус-лифтинг*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии**Научный руководитель: асс. Гасратов А.Ю.*

Актуальность. На сегодняшний день широкое распространение получила операция денальной имплантации. Данному хирургическому вмешательству в некоторых случаях предшествует операция синус-лифтинга. В ходе операции синус-лифтинга может возникнуть ряд осложнений. Знание этиологии возникновения осложнений поможет снизить частоту их встречаемости.

Цель: выявить частоту встречаемости в ходе операции осложнений.

Задачи:

1. Выявить причины, вызывающие осложнения.
2. Определить частоту встречаемости тех или иных осложнений.

Результаты. Перфорация гайморовой пазухи: частота встречаемости 5 %. Пробождение дна гайморовой пазухи может быть связано с истончением ее стенок, работой неправильно подобранным инструментарием и перегревом кости.

Проникновение инфекции: частота встречаемости 7%. Проникновение инфекции в послеоперационную рану либо в гайморову пазуху может быть обусловлено нарушением правил асептики и антисептики в ходе проведения операции. Развитие инфекции может быть связано с отказом от приема антибактериальных средств, снижением иммунитета, нарушением соблюдения правил гигиены ротовой полости в реабилитационном периоде

Профузное кровотечение: частота встречаемости 5%. Причиной обильного кровотечения может быть особое анатомическое строение гайморовой пазухи, патология свертывающей системы крови, прием различных препаратов.

Резорбция костнопластического материала может возникнуть вследствие неправильно выбранного материала, в результате использования нестерильного материала, расхождения швов.

Вывод. Тщательное планирование и соблюдение правильной техники манипуляций помогут снизить вероятность возникновения осложнений или полностью устранить их.

Ключевые слова: синус-лифтинг, осложнения