

ID: 2019-08-8-T-18915

Тезис

Халидова М.С.

Эрадикация *H. pylori* в клинической практике*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии**Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.*

Под нашим наблюдением находилось 28 больных, которым назначалась эрадикационная терапия. Перед лечением проводилась диагностика инфекции *H. pylori*, оценивалось наличие показаний и противопоказаний к лечению, лекарственный анамнез, сопутствующая лекарственная терапия. Возраст пациентов составил от 25 до 64 лет, из них 15 женщин и 13 мужчин. У 2 пациентов имелась аллергия к пенициллинам. Большинство пациентов (20 человек) ранее не получали эрадикационную схему, у 7 эрадикация проводилась однократно, у одной пациентки - двукратно.

Нами назначалась тройная терапия с использованием двойных доз ИПП (20 человек), из них у 12 к тройной терапии был добавлен препарат висмута в стандартной дозе. 7 пациентам назначена квадротерапия с висмутом, одной - схема с левофлоксацином. У 10 пациентов в схему лечения включались пробиотики на весь курс лечения. Продолжительность лечения во всех случаях составила 14 дней.

9 человек сообщили о побочных эффектах терапии (нарушения вкуса, диарея, тошнота, абдоминальная боль, диспепсия), которые были выражены минимально и не стали поводом для отмены терапии.

Результаты оценивались минимум через 4 недели после окончания терапии, использовались определение антигена *H. pylori* в кале или С13 уреазный дыхательный тест. У 21 пациента терапия оказалась эффективной, у 7 эрадикация достигнута не была. Таким образом уровень эрадикации у наблюдаемых нами пациентов составил 75%.

Ключевые слова: эрадикация, *H. pylori*, квадротерапия