Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2021. Volume 11. Issue 4

ID: 2021-04-1276-T-19526 Тезис

Захарцов А.В.

# Значение первично-множественных опухолей среди онкоурологических заболеваний

*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии*

*Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н.*

Первично-множественные опухоли – это независимое возникновение и развитие у одного больного двух или более новообразований.

Недостаточная информированность врачей о возможности множественного опухолевого поражения зачастую является причиной того, что после выявления одной злокачественной опухоли не принимается во внимание возможность существования других опухолей и поэтому в некоторых случаях не производится целенаправленное исследование других отделов органа, в котором развилась опухоль, а также других органов.

**Цель:** установить частоту первично-множественных опухолей среди онкоурологических больных.

**Материал и методы.** Изучены истории болезни 119 больных (женщин 26, мужчин 93) средний возраст 67 лет, у которых диагностированы первично-множественные опухоли, в связи с чем проходили лечение в клинике урологии СГМУ с января 2015 по апрель 2021г. (статистика за 6 лет). Применялись общеклинические методы, УЗИ, КТ, МРТ-диагностика.

**Результаты.** У 15 больных обнаружены по три опухоли (М 10, Ж 5), у 2 больного – сразу 4.

Наиболее частыми новообразованиями был рак почки (65 опухолей) в основном Т1 (43) и Т3 (14), Т2 (7) стадии, рак предстательной железы 54 – стадии Т3 (28) и Т2 (23), рак мочевого пузыря 48 – стадии Т1 (25), Т2 (15), Т3 (7), рак кожи 15 стадии Т1, рак прямой кишки 9 стадии Т2 (4), Т3 (3), рак матки стадии 7 Т2 (6), рак легкого 6 Т2 (3), Т1 (2), рак лоханки и мочеточника 5 Т1 (4), рак желудка 5 Т2, рак сигмовидной кишки 5 Т2 (3).

Рак почки наиболее часто сочетается с рак почки 14 больных, рак простаты 13, рак мочевого пузыря 10, рак кожи 6, рак легкого 4, рак молочной железы 3.

Рак предстательной железы с раком мочевого пузыря 17 больных, рак почки 13, рак прямой кишки 7, рак кожи 4, рак сигмовидной кишки 3, рак гортани 2.

Рак мочевого пузыря с раком простаты 17 больных, рак почки 10, рак матки 4, рак легкого 3, рак желудка 2, рак молочной железы 2.

Наиболее часто проводимое лечение: ТУР Мочевого пузыря 15, Билатеральная орхэктомия 12, Резекция почки + Нефрэктомия 8, Нефрэктомия 7, Резекция почки 6, Билатеральная орхэктомия + ТУР мочевого пузыря 6, Нефрэктомия + ТУР Мочевого пузыря 5, ТУР простаты + HIFU аблация 5, Нефробиопсия 4, Идеальная нефруретерэктомия + ТУР мочевого пузыря 4, ТУР мочевого пузыря + Цистпростатвезикулэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 4, ТРБ постаты 4, Нефрэктомия + ТУР HIFU аблация простаты 3, Нефрэктомия + Билатеральная орхэктомия 3, ТУР мочевого пузыря + ТУР HIFU аблация простаты 3, Нефрэктомия + РЧА 2, Нефрэктомия + ТРБ 2, Нефрэктомия + нефробиопсия 2, Цистэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 2, Билатеральная орхэктомия + Нефробиопсия 2

**Ключевые слова:** первично-множественные опухоли, онкология, рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы, онкоурология

 © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021