

ID: 2022-04-1212-T-19641

Тезис

Борщ Д.В., Колесников Д.А., Свиарева И.В., Боева Н.Ю., Кондуфор О.В.

Сравнение состояния абстрактного мышления у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством и шизофренией

ЛГМУ имени Святителя Луки

Актуальность. Расстройства когнитивной сферы наблюдаются при многих психических расстройствах. Органическое шизофреноподобное расстройство схоже с шизофренией, однако имеет четкую этиологию, связанную с повреждением головного мозга. Если в вопросах изучения различий в общей, позитивной и негативной симптоматики данных заболеваний имеется достаточно данных, то когнитивные нарушения изучены не так хорошо.

Цель: сравнить состояние абстрактного мышления у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством и шизофренией.

Материал и методы. В исследовании приняло участие 35 пациентов (средний возраст $35,8 \pm 4,3$ лет, среди них 22 мужчины и 13 женщин), находящихся на лечении в ГУ «ЛРКПНБ» ЛНР. Все участники были разделены на две исследуемые группы: 1-я – пациенты с шизофренией ($n=24$), 2-я – пациенты с органическим бредовым расстройством ($n=11$). Из психометрических методов применялись MoCa, MMSE и PANSS. Обработка данных произведена в программе Statistica 12.5 с применением критерия Манна-Уитни для оценки количественного типа данных и критерия χ^2 Пирсона при анализе качественного типа ($p \leq 0,05$).

Результаты. По результатам исследования установлено, что большее число пациентов 1-й группы успешно проходило задание на оценку абстрактного мышления MoCa ($\chi^2=24,561$, $p=0,001$) и сам тест в целом ($\chi^2=20,277$, $p=0,001$). Подобное наблюдалось и при сравнении теста MMSE: пациенты 1-й группы чаще имели более успешный результат по сравнению со 2-й группой ($\chi^2=22,755$, $p=0,002$). Статистически достоверной разницы в баллах по субшкале позитивных симптомов PANSS не было выявлено, по субшкале же негативных симптомов установлена более высокая их выраженность у пациентов 2-й группы (на 3,2 балла больше, $p=0,021$).

Выводы. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что у пациентов с органическим шизофреноподобным расстройством более выражены нарушения как абстрактного мышления, так и когнитивной сферы в целом по сравнению с лицами, страдающими шизофренией.

Ключевые слова: шизофрения, когнитивные функции, абстрактное мышление