

ID: 2022-04-1212-T-19642

Тезис

Воронько Е.А., Колесников Д.А., Чистякова Ю.С., Лисицкая С.В., Кондуфор О.В.

Уровень социального функционирования пациентов с шизофренией и дефектом личности уровня редукации энергетического потенциала*ЛГМУ имени Святителя Луки*

Актуальность. Негативные изменения личности в виду эндогенного процесса всегда считались классическими для шизофрении. Среди данных личностных дефектов следует выделить редукацию энергетического потенциала ввиду её выраженного влияния на социальную адаптацию пациентов, что приводит к их инвалидизации. Однако исследований, определяющих психометрически уровень повседневного и социального функционирования, до сих не проведено.

Цель: оценить уровень социального и повседневного функционирования пациентов с шизофренией и дефектом личности уровня редукации энергетического потенциала.

Материал и методы. В ходе работы было обследовано 40 пациентов с диагнозом параноидная шизофрения. Все пациенты на момент исследования находились на лечении в ГУ «ЛРКПНБ» ЛНР. Число мужчин – 17 (42,5%), женщин – 23 (57,5%), средний возраст – $39,5 \pm 2,9$. Выделено две исследуемые группы: 1-я – пациенты без дефекта личности ($n=22$), 2-я – пациенты с личностным дефектом уровня редукации энергетического потенциала ($n=18$). Применялись клиничко-психопатологический, катамнестический, психометрические методы (PANSS, PSP, MoCa). Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA V.12.5 с использованием U-критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции Спирмена ($p \leq 0,05$).

Результаты. При сравнении средних баллов двух групп по шкале PSP было установлено, что пациенты 1-й группы имели более хорошие результаты на 45,2 балла ($p < 0,05$). Также было установлено достоверно более высокое значение по тесту MoCa у пациентов 1-й группы (на 11 баллов больше, $p < 0,05$). Достоверной разницы по субшкалам PANSS выявлено не было. При проведении корреляционного анализа установлена прямая высокая взаимосвязь между показателем шкалы PSP и теста MoCa ($r=0,877$, $p < 0,05$).

Выводы. Пациенты с шизофренией, имеющие личностный дефект уровня редукации энергетического потенциала имеют более низкий показатель повседневного и социального функционирования в сравнении с пациентами, не имеющими данный дефект.

Ключевые слова: шизофрения, негативные симптомы, социальное функционирование