

ID: 2023-09-1276-T-19807

Тезис

Самсонов Б.О.

**Результаты хирургического лечения болезни Пейрони***ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии**Научные руководители: к.м.н. Евдокимов А.В., к.м.н. Понукалин А.Н.*

**Актуальность.** Болезнь Пейрони (БП) - заболевание характеризующееся рубцовыми изменением белочной оболочки с потерей ее эластичности, и приводящее к деформации полового члена. Распространенность БП среди мужчин 40–70 лет составляет 3–5%. Нередко данное заболевание ассоциировано с эректильной дисфункцией, которую диагностируют у 20–54% пациентов с БП. Заболевание не угрожает жизни, однако часто вызывает озабоченность и настороженность пациентов. Нарушение копулятивной функции всегда является основной, снижающей качество жизни жалобой, определяющей потребность в получении медицинской помощи. Известно, что 70% пациентов с БП беспокоит искривление полового члена при эрекции. Оперативное лечение необходимо при выраженной эректильной деформации и невозможности коитуса. В связи с этим представляет интерес изучение результатов оперативного лечения искривления полового члена при БП.

**Материал и методы.** В основе исследования результаты обследования и лечения 37 мужчин с БП, получивших оперативное лечение в клинике урологии УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева с 2011 по 2021 гг. При анализе архивных историй проанализированы такие данные, как возраст, жалобы, сопутствующая патология, предрасполагающие факторы, сроки заболевания, данные об амбулаторном лечении, данные объективного осмотра, лабораторные и инструментальные обследования, данные фотофиксации степени искривления полового члена при эрекции. Все пациенты были оперированы после стабилизации клинического течения болезни - исчезновения болей и прекращения нарастания искривления на протяжении 3 месяцев. Оперативное вмешательство заключалось в выделении участка белочной оболочки на стороне, противоположной искривлению, и гофрировании белочной оболочки по Несбиту – Щеплеву.

**Результаты.** 70 % данных пациентов дали согласие на оценку эффективности оперативного лечения. Для мониторинга оценки степени удовлетворенности пациентов полученным лечением использовали анкетирование, включавшее опросник МИЭФ-5 (международный индекс эректильной дисфункции) и анкету для пациентов после оперативного лечения БП (П.А. Щеплев). Изучение отдаленных результатов показали высокую эффективность данного хирургического метода лечения. Большинство пациентов оказались удовлетворены проведенным лечением. В раннем послеоперационном периоде эректильная деформация была устранена в 100 % случаев.

**Заключение.** Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что хирургическое лечение искривления полового члена при БП путем пликационной корпоропластики это эффективный метод лечения. Метод позволяет быстро добиться нормализации формы полового члена без ущерба для эректильной функции, что дает восстановить половую жизнь.

**Ключевые слова:** болезнь Пейрони, урология, андрология